

用。因此只有②③⑥才對，無解，只好選(C)較正確。

43.心律調節器放置於前胸，術後三天內勿睡向傷口側，抬高頭部不可超過30度。

44.急性心肌梗塞心肌酶均上升：CK-MB、SGOT、LDH<sub>1</sub>上升。

45.Killip依心肌梗塞的合併症分為四級：I 無左心室衰竭之合併症發生；II 左心室呈現輕度至中度衰竭；III 左心室嚴重衰竭，出現肺水腫；IV 出現心因性休克。

46.化學藥物準備程序：①在「垂直型」風櫃操作；⑤應保持vial內為「負」壓，抽藥時才不會因為壓力過大使藥物噴出。

47.絕對嗜中性白血球是Seg + Band兩者之和。Seg 40% + Band 5% = 45%，兩者占WBC總數2,000的45%， $2,000 \times 45\% = 900$ 。

48.癌症疼痛處置：③疼痛發生「前」給予止痛藥效果較好；⑤Demerol適用在「急性」疼痛，慢性劇烈性的癌症疼痛首選的止痛藥物為Morphine。

49.(A)在骨髓移植後，免疫系統至少要在6個月至1年間才會恢復，此段時間應盡量避免涉足公共場所，以減少感染的發生。(C)外出時，要穿著長袖衣服及戴帽子或太陽眼鏡以防日曬，至少要一年。

50.(A)使用Warfarin才會使Prothrombin time增加，肝素則會使PTT（部分凝血酶時間延長；(C)D-dimer增加：表明血管網路中有過量的纖維蛋白形成，是診斷深靜脈栓塞（DVT），肺栓塞（PE），瀰漫性血管內凝血（DIC）的關鍵試驗指標；(D)纖維蛋白分解產物：是胞漿素將已凝集成塊的Fibrin或Fibrinogen溶解而產生的。PT及PTT是用來偵測「凝血功能」，而D-dimer及纖維蛋白分解產物是用來偵測「抗凝血」的功能。

51.(A)虹輪視覺及(D)眼睛劇痛：為青光眼的症狀；(B)眼睛畏光：白內障。

52.(B)耳蝸植入術：為雙耳極度聽力喪失者適用；(C)鎧骨切除術：為耳硬化症的療法；(D)前庭神經切斷：為美尼爾氏症的療法。

53.喉切除手術後：鼻胃管放置7~14天，試著吞開水，不會嗆到就可拔N-G，由口進食。

54.白內障手術後，要深呼吸，但不要咳嗽。

55.(A)低血鈣才會使血管擴張，降低血壓；(B)鉀離子與神經肌肉的應激性有