

67MC100905基本護理學 增補資料

P.2-22 題目

1. 有關護病專業性人際關係工作期護理重點的敘述，下列何者正確？ (A)避免與病人討論過去未規則服藥原因 (B)小心病人試探性行爲，真誠提供照護 (C)收集病人基本資料及疾病治療史 (D)協助病人定時練習自我照顧技巧。 (D)

P.6-5 題目

2. 50%酒精適用於下列何種情況？①義眼不戴時的浸泡消毒；②頭髮沾染血液時的清洗；③頭髮梳不開時用來潤滑；④老年人按摩時用來促進血液循環 (A)①② (B)②③ (C)①④ (D)③④。 (B)

P.9-16 2 說明

名稱	說明	
2. 脈搏的測量	部位	適用情況
	⑦膝膕動脈	A. 位於膝蓋後的膝膕窩，稍微彎曲膝蓋較容易測得。 B. 用於測下肢血壓的聽診部位。 C. 評估下肢循環。
	⑧脛後動脈	A. 位於踝關節內面。 B. 可以評估腳的循環（水腫、肥胖不易摸到）。
⑨足背動脈	A. 位在足背上第一與第二腳趾間。 B. 可以評估腳的循環。	

P.13-11 第7點低血鈣的導因

問題	導因	症狀及徵象
7. 低血鈣 (hypocalcemia)	輸入多量含檸檬酸鹽之血液、快速輸入肝素、急性胰臟炎（嚴重嘔吐使鈣離子流失）、腹膜炎、長期 <u>過度使用瀉劑、副甲狀腺功能不良或切除者</u>	(1)肢體末端或口唇周圍麻木刺痛感。 (2)焦慮、不安、腕痙攣、足痙攣。 (3)腹部痙攣、腹瀉，或吞嚥困難。 (4)心律不整、凝血改變。 (5)沃斯德充氏徵（Chvostek's sign）陽性。 (6)特魯索氏徵（Trousseau's sign）陽性。 (7)骨質疏鬆、病理性骨折。