

「兒科護理學考前衝刺」增補資料

| 頁數 | 增補資料 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------------------------|----------------------------------|----------------|---|--|---|-------|------|-----|-----|---|---|----|-----------|
| P1-19 | ◎小客車承載幼兒規定： <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 齡</th> <th>體 重</th> <th>放置位置</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1歲以下</td> <td>體重未滿10公斤</td> <td>應放置……，面朝車尾。</td> </tr> </tbody> </table> | 年 齡 | 體 重 | 放置位置 | 1歲以下 | 體重未滿10公斤 | 應放置……，面朝車尾。 | | | | | | | | |
| 年 齡 | 體 重 | 放置位置 | | | | | | | | | | | | | |
| 1歲以下 | 體重未滿10公斤 | 應放置……，面朝車尾。 | | | | | | | | | | | | | |
| P2-3 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>部 位</th> <th>說 明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>呼吸系統</td> <td>1. …… 2. 嬰幼兒會厭軟骨所占的比例比成人大，……。</td> </tr> </tbody> </table> | 部 位 | 說 明 | 呼吸系統 | 1. …… 2. 嬰幼兒會厭軟骨所占的比例比成人 大 ，……。 | | | | | | | | | | |
| 部 位 | 說 明 | | | | | | | | | | | | | | |
| 呼吸系統 | 1. …… 2. 嬰幼兒會厭軟骨所占的比例比成人 大 ，……。 | | | | | | | | | | | | | | |
| P6-11 | (四)非發紺性心臟病： | | | | | | | | | | | | | | |
| P6-16 | (D)→(C) | | | | | | | | | | | | | | |
| P7-10 | (B)→(D) | | | | | | | | | | | | | | |
| P9-8 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>腎病症候群</th> <th>急性腎絲球腎炎</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>飲食治療</td> <td>1. ……。 2. 急性期：採低鈉、限水、高適量蛋白質、採質優動物性蛋白質為主、高熱量、高醣食物。</td> <td>低鈉、限水、低蛋白。</td> </tr> </tbody> </table> | 項 目 | 腎病症候群 | 急性腎絲球腎炎 | 飲食治療 | 1. ……。 2. 急性期：採低鈉、限水、 高適量蛋白質 、採質優動物性 蛋白質 為主、高熱量、高醣食物。 | 低鈉、限水、 低 蛋白 。 | | | | | | | | |
| 項 目 | 腎病症候群 | 急性腎絲球腎炎 | | | | | | | | | | | | | |
| 飲食治療 | 1. ……。 2. 急性期：採低鈉、限水、 高適量蛋白質 、採質優動物性 蛋白質 為主、高熱量、高醣食物。 | 低鈉、限水、 低 蛋白 。 | | | | | | | | | | | | | |
| P10-2 | 7. 意識狀態評估……。 ※滿分為 15 分，……。 | | | | | | | | | | | | | | |
| P11-2 | 3. 比例如下： <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年 齡</th> <th colspan="3">10歲以上</th> <th>3歲以下</th> </tr> <tr> <th>前</th> <th>後</th> <th>總 計</th> <th>總 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>右下肢</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>18</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table> | 年 齡 | 10歲以上 | | | 3歲以下 | 前 | 後 | 總 計 | 總 計 | 右下肢 | 9 | 9 | 18 | 14 |
| 年 齡 | 10歲以上 | | | 3歲以下 | | | | | | | | | | | |
| | 前 | 後 | 總 計 | 總 計 | | | | | | | | | | | |
| 右下肢 | 9 | 9 | 18 | 14 | | | | | | | | | | | |
| P11-5 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>急救期</th> <th>急性期</th> <th>恢復期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>治療</td> <td>1. …… 2. …… 3. 4c.c. × 燒傷總面積 (%) × 體重 (kg)。</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | 急救期 | 急性期 | 恢復期 | 治療 | 1. …… 2. …… 3. 4c.c. × 燒傷總面積 (%) × 體重 (kg) 。 | | | | | | | | |
| | 急救期 | 急性期 | 恢復期 | | | | | | | | | | | | |
| 治療 | 1. …… 2. …… 3. 4c.c. × 燒傷總面積 (%) × 體重 (kg) 。 | | | | | | | | | | | | | | |
| P13-6 | (五)高、低血糖症狀及緊急處理： <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>低血糖</th> <th>糖尿病型酮酸中毒 (DKA)</th> <th>高滲透壓高血醣狀態 (HHS or HHNK)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>診 斷</td> <td>低血糖……</td> <td>高血糖……</td> <td>血糖……</td> </tr> </tbody> </table> | | 低血糖 | 糖尿病型酮酸中毒 (DKA) | 高滲透壓高血醣狀態 (HHS or HHNK) | 診 斷 | 低血糖…… | 高血糖…… | 血糖…… | | | | | | |
| | 低血糖 | 糖尿病型酮酸中毒 (DKA) | 高滲透壓高血醣狀態 (HHS or HHNK) | | | | | | | | | | | | |
| 診 斷 | 低血糖…… | 高血糖…… | 血糖…… | | | | | | | | | | | | |

P13-7 (六)第一型糖尿病的治療及護理：

1. 飲食方面：

(1)兒童飲食每日熱量需求為：1,000~1,200 卡 + (年齡 - 1) × 100 卡。

P13-10 (9)發展時期的重點衛教重點：

| 時 期 | 特 色 | 照護重點 |
|----------------|----------------|--|
| ①嬰幼兒期 | 幼兒飲食時 間不穩定。 | A. 父母可以安排 自助主餐 和點心 時間.....。 B. C. D. |