

S 精選試題

elect Example

1. 上全身麻醉行胃切除的病人，教導其深呼吸、咳嗽的主要目的為預防： (A)腹脹不適 (B)噁心、嘔吐 (C)肺部合併症 (D)血栓靜脈炎。 (C)
2. 手術後傷口感染，最常見的細菌是什麼？ (A)綠膿桿菌 (B)金黃葡萄球菌 (C)大腸桿菌 (D)白色念珠菌。 (B)
3. 當病人面對手術的壓力時，身體不會產生何種反應？ (A)周邊血管收縮 (B)抗利尿激素分泌增加 (C)胃酸分泌增加 (D)氣管收縮。
 ▶氣管擴張。 (D)
4. 何種部位之手術病患，在手術後適合行咳嗽運動？ (A)腦部 (B)胸部 (C)眼部 (D)喉部。
 ▶不適合咳嗽：腦、眼、耳、鼻、喉部、疝氣手術。 (B)
5. 接受會陰修補手術或大部分直腸手術患者最常採用的手術臥位為何？ (A)膀胱截石臥位 (lithotomy) (B)側臥 (lateral position) (C)背仰臥位 (dorsal recumbent position) (D)椎板切除術臥位 (laminectomy position)。 (A)
6. 進行腎臟或胸腔部位手術之患者，最常採用的手術姿位為何？ (B) (A)膀胱截石位 (lithotomy position) (B)側臥位 (lateral position) (C)垂頭仰臥位 (trendelenburg position) (D)背仰臥位 (dorsal recumbent position)。
7. 下列對於手術室無菌注意事項的描述何者正確？ (A) (A)在胸前、腰部以上及手臂之手肘以上3吋的區域為無菌區 (B)工作人員在手術中應以面對面的方式交換位置 (C)工作人員的雙手可以採取雙手交叉於腋下的姿勢 (D)無菌衣的袖口亦視為無菌區。
8. 下列何者為手術室流動護理人員 (circulating nurse) 的工作職責？ (D) (D) ①嚴格遵守無菌技術刷手、穿戴隔離衣與無菌手套；②協助固定病人，以防病人自手術台上滑落；③與恢復室護理人員交班病人狀況與需注意事項；④必要時協助醫師拉鉤、清除傷口內的液體 (A)①

- ② (B)①③ (C)①④ (D)②③。
9. 全身麻醉劑中下列何者的止痛效果最好，對血壓的影響最輕微？ (A) (A)nitrous oxide (B)halothane (C)enflurane (D)isoflurane。
10. 在常用的吸入性麻醉劑中，下列何者對腎臟具有毒性？ (D) (A)nitrous oxide (N₂O) (B)halothane (Fluothane) (C)isoflurane (Forane) (D)methoxyflurane (Penthrane)。
11. 病患進入全身性麻醉分期的手術期時，會有下列何種的生理反應？ (B) (A)病患會感到嗜睡與頭暈的情形 (B)聽覺與痛覺完全消失 (C)病患呼吸不規則、肌張力有增加的情形 (D)對於外在刺激仍然敏感。
12. 陳先生今年30歲，於今日接受脊髓麻醉以施行下肢擴創手術，在返回病室後，陳先生常主訴頭痛且在枕骨處的疼痛較為明顯，下列的護理措施何者為宜？ (B) (A)向陳先生說明這是接受脊髓麻醉後患者常見情形請盡量忍耐 (B)向陳先生說明在手術後平躺6~8小時、多喝水可減輕症狀 (C)指導病患轉移注意力與放鬆技巧以減輕疼痛 (D)協助以圓滾木翻身來緩和陳先生不適情形。
13. 病患在手術後引起呼吸道阻塞最常見的原因為何？ (A) (A)舌頭向後傾倒 (B)支氣管痙攣 (C)胃內容物吸入 (D)疼痛。
 ▶呼吸道阻塞的原因：(1)舌頭堵住呼吸道；(2)黏液聚集在喉嚨；(3)吞嚥反射喪失；(4)吸入黏液或嘔吐物。
14. 下列對於手術工作人員穿著的說明，何者正確？①脫去口罩時雙手應抓住口罩本體的部分；②上衣必須放入長褲內；③穿著無菌衣的人員應保持手在胸前腰部以上；④外套的袖口可寬鬆不收口 (C) (A)①② (B)①③ (C)②③ (D)②④。
15. 手術進行前，開刀房護士進行外科刷手的目的為： (A) (A)預防病人於手術中遭到感染 (B)預防護士於手術中遭到感染 (C)避免開刀房的環境受污染 (D)保持護士的雙手無菌。
16. 下列何者不是手術後患者之病房立即護理？ (D) (A)傷口評估 (B)引流管功能確認 (C)疼痛控制 (D)說明手術進行內容。
17. 下列為全身麻醉手術病人之術前護理指導內容，其中何者不適宜？ (C) (A)練習做深呼吸及咳嗽 (B)強調術後肢體活動及變換臥位之必要性