

100-12 內外科護理學歷屆試題詳解

- 23.庫欣氏症候群：為糖皮質類固醇分泌過多造成，蛋白質被分解，脂肪重新分佈。除了圓月臉、水牛肩、軀幹肥胖外，易感染、易骨折、留鈉留水排鉀排氫。因此(B)鼓勵採「高」蛋白、低鉀及低熱量飲食。
- 24.(C)橫膈膜離軌度正常為3~6公分，COPD者會降低，所以給藥應是「增加」離軌度。
- 25.E為張眼反應：E₄自動張眼、E₃叫時張眼、E₂痛時張眼、E₁不會張眼；M為運動反應：M₆能By order動作、M₅有目地的動作、M₄回縮動作、M₃去大腦皮質僵直（手屈曲，腳內旋）：大腦受損、M₂去大腦僵直（手伸張，腳內旋）：腦幹受損、M₁沒有動作；V為語言反應：V_T為氣切；V_E為氣管內管。兩側肢體的活動度不同，則以較佳的M₃為主。
- 26.(A)甲狀腺荷爾蒙分泌「過多」導致甲狀腺機能亢進，又遇壓力時產生，未治療可致死；(B)可因抗甲狀腺藥物「不足」及壓力過大誘發；(C)會出現「體溫過高」、心跳過速、呼吸窘迫及躁動不安等徵象。
- 27.(B)類固醇不會有肝毒性，環孢靈素（cyclosporine）才有肝腎毒性；(C)出現排斥現象時，應先就醫，由醫師找出原因，可能需要調整藥物劑量；(D)主要作用為抑制T細胞毒性淋巴球增生。
- 28.(D)控制鈉的攝取，不可採用代鹽製品，因其少鈉但鉀高，不適合腎臟疾病；腎病要限鈉限鉀。但心臟病及高血壓則適合。
- 29.④缺氧會刺激交感神經代償，使HR↑、呼吸過「速」；⑥呼吸窘迫則呼不出二氧化碳，會堆積在體內，其分壓會上升。
- 30.AIDS空窗期：表示有感染，但還查不到病毒的抗體，平均約6~12週，這段時間會傳染給他人，(A)HIV抗體試驗呈陽性反應：則可確定為AIDS的感染者；(B)併發伺機性感染：為AIDS的C期了，確定為AIDS；(D)明顯之愛滋病複合病症：也是C期病人了。
- 31.(A)病人用過的免洗餐具，以「感染」可燃性廢棄物處理。
- 32.類固醇藥物副作用：體重增加，月亮臉、水牛肩、身軀變胖，四肢細瘦，水分和鈉類滯留導致水腫、高血壓、糖尿病、骨質疏鬆症、高尿鈣、消化道潰瘍。(A)高蛋白、「低醣」飲食；(C)骨質疏鬆症、高尿鈣，要進食「高鈣」飲食；(D)會消化道潰瘍，於「飯後」服藥。
- 33.帶狀疱疹：(B)神經痛是沿著皮節神經進行，燒灼感或深部內臟的疼痛