

114年第一次專技高考護理師

兒科護理學 試題暨解答

1. 兒童急救的生命之鏈 (pediatric chain of survival) 有五個環環相扣的重要程序，第一步驟為何？ (A)預防傷害發生 (B)儘早心肺復甦術 (C)儘早高級醫療照護 (D)啟動緊急救護系統。

答案：(A)

▶▶解析：

兒童急救的生命之鏈：1.預防傷害發生→2.啟動緊急救護系統→3.儘早心肺復甦術→4.儘早高級醫療照護→5.心臟停止後照護→6.復原。

2. 有關兒童遭受虐待的護理處置，下列敘述何者錯誤？ (A)儘速將受虐者與施虐者隔離，避免兒童繼續遭受虐待 (B)受虐者須與父母一起接受問診確認事情發生過程，不能分開會談 (C)執行醫療照護時，需注意受虐兒童隱私問題 (D)得知父母親缺乏支持系統，加上經濟壓力，應儘快提供社會資源。

答案：(B)

▶▶解析：

(B)錯。收集資料的過程中，兒童可能因擔心父母不相信自己所說的話，或父母本身就是施虐者，而不敢吐露實情。需要時可以使父母與兒童分開會談。

重點提示

兒童虐待

1. 類型：包括身體虐待、精神虐待、性虐待、疏忽或遺棄等。
2. 施虐者：大多為兒童熟悉或親近的人，其中占多數為父母親。

114
年

兒童虐待

3. 護理評估：

- (1) 收集病童受傷的正確時間、地點、事件發生經過。
- (2) 評估受虐狀況：身心發展、一般生長、行為態度、受虐時間、頻率。
- (3) 使用開放性問句收集資料，如問父母「孩子怎麼受傷的？」。
- (4) 需要時，應使父母與兒童分開會談，以免兒童因父母在場而不敢吐露實情。
- (5) 勿以批評的態度對待父母或照顧者，勿主觀斷定父母就是施暴者。誰是施暴者，應由社工及警政單位認定。

4. 護理重點：

- (1) 協助確認出受虐兒童，提供保護措施，預防遭受進一步傷害；必要時採取保護隔離措施。
- (2) 依兒少法規定，於執行業務時知悉兒童及少年遭受虐待或疏忽等，應於24小時內向當地主管機關報告；若民眾發現疑似兒童被虐待，可向警察機關或透過「113」全國婦幼保護專線等報案。
- (3) 執行醫療照護時，需注意受虐兒童隱私問題；採取任何醫療處置或護理活動，都要向受虐兒童清楚說明及解釋。
- (4) 關懷父母的需求，將整個家庭納入關懷的對象，若得知父母親缺乏支持系統或有經濟壓力，應儘快提供社會資源。
- (5) 盡早發現潛藏的危機家庭，提供事前的預防，以防虐童事件再度發生。

3. 護理師提供父母親對自閉症兒童的照護指導，下列敘述何者不適當？
- (A) 可增加居家環境的改變，刺激其認知學習 (B) 行為症狀會持續至成人期 (C) 使用抗焦慮障礙劑或中樞神經活化劑等藥物，以減輕症狀 (D) 多於幼兒期即被發現，宜即早安排接受早期療育。

答案：(A)

▶▶解析：

- (A)錯。病童常併有重複固著行為，堅持固定的生活習慣或環境布置，對環境的改變非常敏感，易出現混亂、不安及失控的情緒，最好能維持環境的一致性，及維持治療、吃飯、就寢時間等生活常規。
- (B)(D)對。通常在2歲半之前，就會被發現有明顯的異常症狀，且症狀會持續到成人期，宜即早接受早期療育。
- (C)對。自閉症目前並無藥物可以治癒，但若有嚴重的自傷、攻擊行為，必要時依醫囑給予抗思慮障礙劑或中樞神經活化劑等藥物，暫時緩解症狀。

 重點提示

自閉症	<ol style="list-style-type: none"> 1. 因先天腦部功能受損，所引起的廣泛性發展障礙。 2. 通常在2歲半之前，就會被發現有明顯的異常症狀。 3. 行為特徵： <ol style="list-style-type: none"> (1) 社交技巧的障礙：呈現孤立的人際互動。 (2) 語言和溝通能力障礙。 (3) 重複性的行為模式：堅持固定的生活習慣或環境布置。 4. 醫護重點： <ol style="list-style-type: none"> (1) 目前並無藥物可以治癒。 (2) 常有自傷行為，需持續密切觀察，並維持安全的環境。 (3) 若有嚴重的自傷、攻擊行為，必要時依醫囑給予抗思慮障礙劑或中樞神經活化劑等藥物，暫時緩解症狀。 (4) 接受、不特別關注自閉兒童的重複固著行為，必要時可了解其原因。 (5) 病童對環境的改變非常敏感，易出現混亂、不安現象，最好能維持環境的一致性，及維持治療、吃飯、就寢時間等生活常規。 (6) 部分兒童對身體碰觸較排斥，故若要擁抱或觸摸病童，必須提前告知，且徵求病童同意後，才可以碰觸之。
-----	--

114
年

自閉症	(7)採行為治療，以增強或減弱的方法，改善其不適應的行為。
-----	-------------------------------

4. 10個月大新生兒進行身體檢查仍會有的反射項目，下列何者最為正確？
 (A)驚嚇反射 (startle reflex) (B)手掌抓握反射 (palmar grasp reflex)
 (C)踏步反射 (stepping reflex) (D)巴賓斯基氏反射 (Babinski's reflex)。

答案：(D)

►►解析：

新生兒神經反射，大部分反射都在3~4個月消失；只有巴賓斯基反射 (Babinski's reflex)：1歲消失；另外蹠抓握反射：約8~9個月消失。

 重點提示

擁抱反射	1. 抱起嬰兒再突然將頭放低，會出現雙手外展，手指彎成C形，而後四肢屈曲，成擁抱狀。 2. 若兩手不對稱：表示臂神經叢受損或鎖骨骨折。 3. 約3~4個月消失。
驚嚇反射	1. 突然大的聲音刺激，會出現類似擁抱反射的動作。 2. 約3~4個月消失。
手掌抓握反射	1. 將手指放於嬰兒的手掌，嬰兒會緊緊握住手指。 2. 約3~4個月消失。
尋乳反射	1. 以手指或奶嘴輕觸嬰兒嘴角，頭會轉向被刺激側，出現張嘴動作，企圖吸吮。 2. 約3~4個月消失。
吸吮反射	1. 將奶嘴或手指伸入口中，會出現規律的吸吮動作。 2. 約3~4個月消失。
頸部強直反射	1. 嬰兒平躺，將頭轉迅速轉向一側，同側的手腳會伸展，對側的手腳屈曲，如拉弓箭般的姿勢。 2. 約3~4個月消失。

114
年


踏步反射	1. 將新生兒自腋下抱起使其站立，雙腳輕觸在平面上，其雙腳會呈現踏步動作。 2. 約3~4個月消失。
蹠抓握反射	1. 手指放於嬰兒腳掌球區處，嬰兒全部腳趾呈屈曲。 2. 約8~9個月消失。
巴賓斯基反射	1. 以手指由腳跟沿足底外側到腳趾畫線，出現腳趾伸展張開(陽性)。 2. 約1歲左右消失。

5. 有關兒童使用眼藥的注意事項，下列敘述何者正確？ (A)將眼藥膏塗抹於下眼瞼結膜上 (B)將眼藥水滴於下眼瞼結膜外側 (C)給藥時請兒童頭後仰且往下看 (D)醫囑O.D是指雙眼給藥。

答案：(A)

►►解析：

- (A)對。本題正解。
 (B)錯。不論是點眼藥膏或滴眼藥水，均應是在下眼瞼結膜上。
 (C)錯。應是頭後仰且往上看。
 (D)錯。OD→右眼；OS→左眼；OU→雙眼。

 重點提示

給眼藥	1. 採仰臥或坐姿，頭往後傾，請病人眼睛向上看。 2. 滴藥水(或塗抹藥膏)在下眼瞼結膜處，不可滴在角膜上。 3. 請病人閉上眼睛，轉動眼球。 4. 滴眼藥水後，以乾棉球由內眥往外眥，拭去多餘的藥水，再以棉球壓住鼻淚管數十秒，防藥水流入鼻腔。 5. 應以外科技術操作，預防交互感染。 6. 若併用兩種眼藥：需間隔5分鐘以上。 7. 先滴水劑→再滴油劑；先點眼藥水→再塗抹眼藥膏。
-----	---