如一個函數含有兩個或以上的自變數時，則對此函數所有之微分均屬偏微分型，此種類型之微分方程式即稱為偏微分方程式(Partial Differential Equation，簡稱 P.D.E.)，科學上凡是跟“時間”與“位置”相關之函數，所導出的均為 P.D.E.，如熱傳、波動、振動、流力、財工、…。大部份的 P.D.E. 其通解不易求得，近年來多使用電腦求解，所以 P.D.E. 的觀念更須精進，如此才能選擇最正確的路！

§1-1 基本定義

在探討 P.D.E. 時，要將方程式之“自變數”與“因變數”分辨清楚。P.D.E. 分類的名詞，如階、齊次與非齊次，其定義皆與 O.D.E. 相同，因此學起來可以駕輕就熟。但在“線性與非線性”之定義裡，在分類上多出二個所謂“半線性”(semi-linear)、“準線性”(quasi-linear)之定義，現分類說明如下：

定義 階(order)

一個 P.D.E. 中，“導函數”之最高階數即稱為該 P.D.E. 的階數。

定義 線性(linear)

一個 P.D.E. 中，未知函數之間或未知函數與其導函數之間無相互乘積，且未知函數及其導函數均為一次，稱為線性 P.D.E.，否則稱為非線性 P.D.E.。

線性 P.D.E. 是可以寫成通式的，且以目前的科技水平而言，線性 P.D.E. 是可以被解出的(包含利用電腦之數值解)。

定義 齊次與非齊次

一線性 P.D.E. 中，含純為自變數函數之項(包括常數項)者若存在，稱為非齊次 P.D.E.，否則稱為齊次 P.D.E.。

1-4 偏微分方程式與數值解

若此 P.D.E. 已為非線性，再細分如下：

定義 半線性(semi-linear)

在一個非線性 P.D.E. 中，其最高階導數項前面之係數僅與自變數有關，稱為半線性 P.D.E.。

定義 準線性(quasi-linear)

一個非線性 P.D.E. 中，最高階導數項前面之係數其微分階數皆比此 P.D.E. 之階數小，稱為準線性 P.D.E.。

定義 完全非線性(fully nonlinear)

一個非線性 P.D.E. 若不屬於準線性者，稱為完全非線性 P.D.E.。

心得 P.D.E. : $\left\{ \begin{array}{l} \text{線性：最容易解} \\ \text{非線性} \left\{ \begin{array}{l} \text{半線性：稍難解(50%非線性)} \\ \text{準線性：更難解(80%非線性)} \\ \text{完全非線性：最難解(100%非線性)} \end{array} \right. \end{array} \right.$

且：線性 $\subset$ 半線性 $\subset$ 準線性 $\subset$ 完全非線性。

說例 1 基本題	判斷下列 P.D.E. 之類型。
-------------	------------------

[解]

(1) $u_t = u_{xx}$: 二階線性齊次 P.D.E.。

(2) $u_{tt} = u_{xx} + \sin x$: 二階線性非齊次 P.D.E.。

(3) $u_t = u_{xx} + u^2$: 二階半線性 P.D.E.，其中 u_{xx} 之係數僅為常數。

(4) $u_t = xu_{xx} + u^2$: 二階半線性 P.D.E.，其中 u_{xx} 之係數僅與 x 有關。

(5) $u_t + uu_x = 0$: 一階準線性 P.D.E.，其中 u_x 之係數與 u 有關。

(6) $u_t u_{xx} + u_x = 0$: 二階準線性 P.D.E.，其中 u_{xx} 之係數與 u_t 有關。

(7) $(u_x)^2 + (u_y)^2 = 1$: 一階完全非線性 P.D.E.。

(8) $u_{xx}u_{yy} + (u_{xy})^2 = \sin x$: 二階完全非線性 P.D.E.。

* * *

再說明一要點：準線性 P.D.E. 與線性 P.D.E. 一樣仍有通式可以表達，且“一階”準線性 P.D.E. 在通式上已經包含了一階線性 P.D.E.，因此只要學會“一階”準線性 P.D.E. 之解法，就已經會解一階線性 P.D.E. 了(此事實詳下章之說明)！

又我們在剛開始學解一 P.D.E. 時，會發現如下之現象：一個 P.D.E. 同時有好幾個解。例如：

$$\begin{array}{ll} u_1(x, y) = x^2 - y^2 & ; \quad u_2(x, y) = e^x \cos y \\ u_3(x, y) = \ln(x^2 + y^2) & ; \quad u_4(x, y) = 3x^2y - y^3 \end{array}$$

皆為 $u_{xx} + u_{yy} = 0$ 之解(讀者將 u_1 、 u_2 、 u_3 、 u_4 代入即知)，但究竟那一個為真正的解？其實每一個都是解！因為所有的 P.D.E. 皆起源自物理或工程問題，因此每個 P.D.E. 的解都要滿足其邊界或啟始條件，亦即必須滿足這些“條件”的考量後才是真正的解，所以這些 u_1 、 u_2 、 u_3 、 u_4 都屬於特解(particular solution)也，在給定條件後才能最後確認。而在 P.D.E. 中，經常會有超過“二個”以上之解，即 P.D.E. 解之自由度比 O.D.E. 更高，因此 P.D.E. 比 O.D.E. 更難解也是個中道理！

以往在解 O.D.E. 時所用到的觀念與方法，在解 P.D.E. 時仍會用到，如疊加原理、未定係數法，此處先敘述疊加原理，其它則於以後再討論。

定理 疊加原理(Superposition Principle)

若 u_1 、 u_2 皆為“線性、齊次” P.D.E. 的解，則 $u = c_1u_1 + c_2u_2$ 亦為原方程式之解，其中 c_1 、 c_2 為常數。

1-6 偏微分方程式與數值解

推廣之，若 $u_1, u_2, \dots$ 皆為一線性齊次 P.D.E. 的解，則

$$u = \sum_{i=1}^{\infty} c_i u_i = c_1 u_1 + c_2 u_2 + \dots \quad \text{亦為原方程式之解。}$$

此處只要是一階(含)以上之 P.D.E. 皆可以使用疊加原理！

說例 2 說明題	我們可以驗證 $u_n = (x+y)^n, n=0,1,2,\dots$ 均為一階線性齊次 P.D.E. $: u_x - u_y = 0$ 之解，故由疊加原理知 $u = \sum_{n=0}^{\infty} c_n u_n = c_0 + c_1(x+y) + c_2(x+y)^2 + \dots = F(x+y)$ 亦為解。
-------------	---

*

*

*

解 P.D.E. 時方程式之“分類”相當重要，有了前面所談的線性、齊次之觀念後，下列之分類對諸位而言是輕而易舉的。

一、一階 P.D.E.

1. 一階線性 P.D.E. 為 $a(x,y)z_x + b(x,y)z_y + c(x,y)z = g(x,y) \quad \dots(1)$

2. 一階準線性 P.D.E. 為 $P(x,y,z)z_x + Q(x,y,z)z_y = R(x,y,z) \quad \dots(2)$

若對照(1)、(2)二式，即知(1)式乃是(2)式之特例而已，所以只要(2)式會解，那(1)式即會解。

二、二階線性 P.D.E.

$$A(x,y)u_{xx} + B(x,y)u_{xy} + C(x,y)u_{yy} + D(x,y)u_x + E(x,y)u_y + F(x,y)u = G(x,y) \quad \dots(3)$$

(3)式可仿照二次曲線分類法而分類如下：

1. 雙曲線型(Hyperbolic)：當 $B^2 - 4AC > 0$ 時
2. 拋物線型(Parabolic)：當 $B^2 - 4AC = 0$ 時
3. 橢圓型(Elliptic)：當 $B^2 - 4AC < 0$ 時

以上三種分類要熟記，分類之原因將於§1-2 中再詳細說明之。

三、二階準線性 P.D.E.

$$Ru_{xx} + Su_{xy} + Tu_{yy} = F \quad \cdots(4)$$

其中 R, S, T, F 為 x, y, u, u_x, u_y 之函數。

說例 3 基本題	判斷如下之二階線性 P.D.E. 之分類。
-------------	-----------------------

[解]

- (1) $u_t = u_{xx} : B^2 - 4AC = 0$ ，為拋物線型。
- (2) $u_{tt} = u_{xx} : B^2 - 4AC = 4 > 0$ ，為雙曲線型。
- (3) $u_{xt} = 0 : B^2 - 4AC = 1 > 0$ ，為雙曲線型。
- (4) $u_{xx} + u_{yy} = 0 : B^2 - 4AC = -4 < 0$ ，為橢圓型。
- (5) 著名之 **Tricomi eq.** : $yu_{xx} + u_{yy} = 0, B^2 - 4AC = -4y$

在 x - y 平面上隨著 y 值而有

$$\begin{cases} y > 0 \Rightarrow \text{橢圓型} \\ y = 0 \Rightarrow \text{拋物線型} \\ y < 0 \Rightarrow \text{雙曲線型} \end{cases}$$

如下圖所示：

類 試決定 $(x^2 - 1)u_{xx} + 2yu_{xy} - u_{yy} + u_x + u_y = 0$ 之區域為

- (1) 雙曲線型 (2) 橢圓型 (3) 拋物線型

答： $B^2 - 4AC = 4y^2 + 4(x^2 - 1) = 4(x^2 + y^2 - 1)$

故得 (1) $x^2 + y^2 > 1$ (2) $x^2 + y^2 < 1$ (3) $x^2 + y^2 = 1$

1-8 偏微分方程式與數值解

初學 P.D.E. 都有一種感覺，即滿懷信心解 P.D.E.，最後解出了，但其解仍是**函數群**，有解與沒解差不多，令人沮喪！不像 O.D.E. 的解都是確定的**函數**，解完 O.D.E. 就很有成就感。P.D.E. 與 O.D.E. 會有此差異，乃 P.D.E. 至少含二個自變數以上，故解之自由度大，相對而言，O.D.E. 則只有一個自變數！以上說明如下表所示：

	O.D.E.	P.D.E.
解法	積分(與 B.C. 無關)	僅少數可積分，其它都要靠經驗或驗算(與 B.C. 有關)
解之外型	僅差積分常數(自由度小) n 階 O.D.E. 有 n 個係數	外型差異很大(自由度大) n 階 P.D.E. 有 n 個任意函數
解之決定	B.C. 或 I.C.	B.C. 或 I.C.，還有與此 P.D.E. 有關之空間幾何結構

※精選習作※

- 決定 $u_{xx} + yu_{yy} = 0$ 之區域為 (台大)
 - 雙曲線型
 - 橢圓型
 - 拋物線型
- P.D.E. : $u_{xx} + xu_{yy} = 0, x > 0$ 之型式為何？

※解答※

- $B^2 - 4AC = 0 - 4y = -4y$ ， $\therefore \begin{cases} y > 0 \Rightarrow \text{橢圓型} \\ y = 0 \Rightarrow \text{拋物線型} \\ y < 0 \Rightarrow \text{雙曲線型} \end{cases}$
- $B^2 - 4AC = -4x < 0$ ，橢圓型。

§1-2 二階線性 P.D.E. 之標準化

在本節中將探討如何知曉何種變數變換，可以簡化二階線性 P.D.E.，也就是如何將一任意二階線性 P.D.E. 如下：

$$A(x, y)u_{xx} + B(x, y)u_{xy} + C(x, y)u_{yy} + D(x, y)u_x + E(x, y)u_y + F(x, y)u = G(x, y) \quad \cdots(1)$$

經過適當的變數變換後化成簡單易分類或可解的型式，這種過程稱為“標準化”。

$$\text{設有一變數變換對如右：} \begin{cases} \xi = \xi(x, y) \\ \eta = \eta(x, y) \end{cases} \quad \cdots(2)$$

$$\text{且(2)式之變換滿足 } \text{Jacobian} \equiv \frac{\partial(\xi, \eta)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial \xi}{\partial x} & \frac{\partial \xi}{\partial y} \\ \frac{\partial \eta}{\partial x} & \frac{\partial \eta}{\partial y} \end{vmatrix} \neq 0, \text{ 則}$$

(以下之推導，相關的來龍去脈可參見本人所著：微積分學習要訣第八章第六節)

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial u}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial x} & ; \text{以基本微分運算法得} \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{\partial u}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial y} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{\partial u}{\partial \xi} \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} + \frac{\partial \xi}{\partial x} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta \partial \xi} \frac{\partial \eta}{\partial x} \right) + \frac{\partial u}{\partial \eta} \frac{\partial^2 \eta}{\partial x^2} + \frac{\partial \eta}{\partial x} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \frac{\partial \eta}{\partial x} \right) \\ &= \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right)^2 + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \left(\frac{\partial \eta}{\partial x} \right)^2 + \frac{\partial u}{\partial \xi} \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \frac{\partial^2 \eta}{\partial x^2} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial u}{\partial \xi} \frac{\partial^2 \xi}{\partial x \partial y} + \frac{\partial \xi}{\partial x} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial y} \right) + \frac{\partial u}{\partial \eta} \frac{\partial^2 \eta}{\partial x \partial y} + \frac{\partial \eta}{\partial x} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \frac{\partial \eta}{\partial y} \right) \\ &= \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{\partial \eta}{\partial x} \frac{\partial \xi}{\partial y} \right) + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \frac{\partial \eta}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial \xi} \frac{\partial^2 \xi}{\partial x \partial y} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \frac{\partial^2 \eta}{\partial x \partial y} \end{aligned}$$

1-10 偏微分方程式與數值解

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= \frac{\partial u}{\partial \xi} \frac{\partial^2 \xi}{\partial y^2} + \frac{\partial \xi}{\partial y} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial y} \right) + \frac{\partial u}{\partial \eta} \frac{\partial^2 \eta}{\partial y^2} + \frac{\partial \eta}{\partial y} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \frac{\partial \eta}{\partial y} \right) \\ &= \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \left(\frac{\partial \xi}{\partial y} \right)^2 + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \frac{\partial \xi}{\partial y} \frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \left(\frac{\partial \eta}{\partial y} \right)^2 + \frac{\partial u}{\partial \xi} \frac{\partial^2 \xi}{\partial y^2} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \frac{\partial^2 \eta}{\partial y^2} \end{aligned}$$

將以上之 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$, $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$ 代入(1)式得

$$\bar{A} \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + \bar{B} \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \bar{C} \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} + \bar{D} \frac{\partial u}{\partial \xi} + \bar{E} \frac{\partial u}{\partial \eta} + \bar{F} u = \bar{G} \quad \cdots(3)$$

其中

$$\left. \begin{aligned} \bar{A} &\equiv A \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right)^2 + B \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial \xi}{\partial y} + C \left(\frac{\partial \xi}{\partial y} \right)^2 \\ \bar{B} &\equiv 2A \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial x} + B \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{\partial \xi}{\partial y} \frac{\partial \eta}{\partial x} \right) + 2C \frac{\partial \xi}{\partial y} \frac{\partial \eta}{\partial y} \\ \bar{C} &\equiv A \left(\frac{\partial \eta}{\partial x} \right)^2 + B \frac{\partial \eta}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial y} + C \left(\frac{\partial \eta}{\partial y} \right)^2 \\ \bar{D} &\equiv A \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} + B \frac{\partial^2 \xi}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 \xi}{\partial y^2} + D \frac{\partial \xi}{\partial x} + E \frac{\partial \xi}{\partial y} \\ \bar{E} &\equiv A \frac{\partial^2 \eta}{\partial x^2} + B \frac{\partial^2 \eta}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 \eta}{\partial y^2} + D \frac{\partial \eta}{\partial x} + E \frac{\partial \eta}{\partial y} \\ \bar{F} &\equiv F \\ \bar{G} &\equiv G \end{aligned} \right\} \quad \cdots(4)$$

因此可以看出：若令 $\bar{A} = \bar{C} = 0$ ，則方程式即可簡化。因 $\bar{A}$ 與 $\bar{C}$ 均具有同一型式，故可以用通式表為

$$\boxed{A \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x} \right)^2 + B \frac{\partial \varphi}{\partial x} \frac{\partial \varphi}{\partial y} + C \left(\frac{\partial \varphi}{\partial y} \right)^2 = 0} \quad \cdots(5)$$

上式中之 φ 可能為 ξ 或 η 。(5)式也可改寫為

$$A \left(\frac{\frac{\partial \varphi}{\partial x}}{\frac{\partial \varphi}{\partial y}} \right)^2 + B \frac{\frac{\partial \varphi}{\partial x}}{\frac{\partial \varphi}{\partial y}} + C = 0 \quad \cdots(6)$$

此處可以利用幾何意義解釋(6)式。

如右圖所示：

沿著曲線 $\varphi = \text{常數}$ ，有：

$$d\varphi = \frac{\partial\varphi}{\partial x} dx + \frac{\partial\varphi}{\partial y} dy = 0$$

$$\text{即 } \frac{dy}{dx} = -\frac{\frac{\partial\varphi}{\partial x}}{\frac{\partial\varphi}{\partial y}} \quad \text{在 } \varphi = \text{常數} \quad \cdots(7)$$

將(7)式代入(6)式得 $A\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - B\frac{dy}{dx} + C = 0 \quad \cdots(8)$

(8)式即為轉換方程式(注意： B 的前面是負號)，特稱為(1)式之特徵方程式(Characteristic eq.)，以熟記為宜。由(8)式分別可得到如下二個微分方程式：

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = \frac{B + \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} \\ \frac{dy}{dx} = \frac{B - \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} \end{cases} \quad \cdots(9)$$

(9)式乃 x - y 平面上沿 $\xi = \text{常數}$ 或 $\eta = \text{常數}$ 之微分方程式，其解稱為特徵曲線(Characteristic curve)，即為我們所要求的變數變換對！

由(9)式中之 $\sqrt{B^2 - 4AC}$ 此項，令我們回憶起本章開頭曾利用 $B^2 - 4AC$ 之值將二階線性 P.D.E. 分類，因此在這兒我們也要以 $B^2 - 4AC$ 之值來闡述各類型方程式“標準化”後之結果。

[I] 雙曲線型： $B^2 - 4AC > 0$

此時由(9)式可得二條不同之特徵曲線，且從 $\bar{A} = \bar{C} = 0$ 之事實，知可將(3)式簡化為

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = H\left(u, \xi, \eta, \frac{\partial u}{\partial \xi}, \frac{\partial u}{\partial \eta}\right) \quad \cdots(10)$$