

內外科護理學歷屆試題詳解

(112.10.03)

頁數	題號	更正內容
109-12	48	(A)若有使用warfarin的抗凝劑則「不鼓勵」食用含高維生素K的青菜類；……
109-31	43	……(D)漱口「30秒~1分鐘」後可以吞服，因不會被腸吸收。
108-8	31	……(C)三尖瓣在右心室與右心房間。而主動脈瓣及二尖瓣則在左心。
108-14	56	……(C)「呼吸性鹼中毒」造成手腳麻刺；……
107-15	60	……(D)胃腸蠕動變緩快、腹瀉。
106-45	26	左心衰竭的症狀從「呼吸困難」開始，再(A)咳嗽→(D)夜間陣發性呼吸困難→(C)端坐呼吸。(B)頸靜脈怒張為「右心」衰竭的症狀。
105-17	71	……(C)留鈉留水後為「高」血容積；……
104-18	73	……(C)胰島素由胰臟的「β細胞」所分泌；……
104-33	51	……(A)「呼吸變淺變快」。
103-3	9	右手0分（正常是5分），是「左大腦」半球受損，右腳的分數（3分）高於右手是「中大腦」動脈受損；若手的分數較高則為「前大腦」動脈受損。
103-8	30	……(C)根據「病因」及「病程」的發展分為急性及亞急性；……
103-22	3	(A)頸椎、胸椎及腰椎損傷屬於「上」運動神經元受損的神經性膀胱，會「過渡」反射；(B)自解尿量：餘尿量=「3：1」訓練才完成；(D)Crede's Method是「下」運動神經元受損的誘尿方式。
103-40	77	(D)迅速正確的檢查傷患，CAB的C是第一步先檢查「頸動脈」有脈動否？