

67MC202501 流行病學重點暨題型解析

頁數	增補資料
1-6	病例對照研究法 (case control study) 若OR>1，便進一步探討是否有正相關 若OR>1，便進一步探討是否有負相關
1-15	「任一檢驗陽性即判斷為陽性」(其過程為第一項檢驗陽性者直接判定為陽性，接著第一項檢驗為陰性者要再進行第二項檢驗來確認，如第二項為陽性則判讀為陽性，如第二項檢驗為陰性才判定為陰性)，此目的在於增加敏感度，特別是嚴重疾病，避免嚴重疾病在檢驗時被遺漏。
1-19	三十、流行病學定義及特徵
2-41	3. 下列關於橫斷研究法 (Cross-sectional Study) 的敘述，何者為非？
2-44	10. 有一研究探討氣喘與支氣管擴張藥物的使用，利用戶籍資料找到107年某一縣市社區所有居民的資料共3,099位，以明信片邀請所有受試者到某家醫院作詳細肺部檢查，在2年期間……
2-57	病例對照研究法 (case control study) 若OR>1，便進一步探討是否有正相關 若OR>1，便進一步探討是否有負相關
2-65	34題答案更正為(B)
2-94	病例對照研究法 (case control study) 若OR>1，便進一步探討是否有正相關 若OR>1，便進一步探討是否有負相關

頁數	增補資料
2-148 2-149 2-150 2-154	【解析】 「任一檢驗陽性即判斷為陽性」(其過程為第一項檢驗陽性者直接判定為陽性，接著第一項檢驗為陰性者要再進行第二項檢驗來確認，如第二項為陽性則判讀為陽性，如第二項檢驗為陰性才判定為陰性)。
2-163	【解析】 任一檢驗為陽性即判斷為陽性，此目的在於增加敏感度，特別是嚴重疾病，避免嚴重疾病在檢驗時被遺漏。
2-172 2-173	【解析】 「任一檢驗陽性即判斷為陽性」(其過程為第一項檢驗陽性者直接判定為陽性，接著第一項檢驗為陰性者要再進行第二項檢驗來確認，如第二項為陽性則判讀為陽性，如第二項檢驗為陰性才判定為陰性)。
3-22	7. 下列關於橫斷研究法 (Cross-sectional Study) 的敘述，何者為非？
3-24	22. 有一研究探討氣喘與支氣管擴張藥物的使用，利用戶籍資料找到107年某一縣市社區所有居民的資料共3,099位，以明信片邀請所有受試者到某家醫院作詳細肺部檢查，在2年期間……